

	SGQ EN-Iso 9001:2008 U.O.C. Centro Trasfusionale	CT_PO_DON_01_ALL01
	Allegato	REV 01 del 05/01/16
	PRINCIPALI MOTIVI DI ESCLUSIONE TEMPORANEA ALLA DONAZIONE	Pag. 1 di 1

SOSPENSIONE DI 4 MESI

- Interventi chirurgici maggiori
- Indagini Endoscopiche (gastro-colonscopia, artroscopia, isteroscopia, laparoscopia...)
- Tatuaggi o Body Piercing
- Trasfusioni, Sieroprofilassi (Antitetanica, Antirabbica)
- Agopuntura se non eseguita da professionisti qualificati con ago usa e getta
- Comportamenti sessuali a rischio:
 - con partner risultato positivo ai test per Epatite B e/o C e/o HIV o a rischio di esserlo,
 - con partner che ha avuto precedenti comportamenti a rischio o del quale il donatore ignora le abitudini sessuali,
 - con partner occasionale,
 - con soggetti tossicodipendenti con scambio di denaro o droga,
 - con partner, di cui non sia noto lo stato sierologico, proveniente da paesi esteri dove l'AIDS è una malattia diffusa
- Cure dentarie con innesto osseo autologo o omologo
- Convivenza con soggetto, non partner sessuale, con positività per HBsAg e/o Anti-HCV, (si applica anche se il donatore è vaccinato per epatite B)

SOSPENSIONE DI 2 MESI

- Manifestazioni allergiche gravi (fatta eccezione per lo shock anafilattico per cui si applica sospensione permanente) a sostanze con particolare riguardo alla penicillina e cefalosporine e veleno di imenotteri.

SOSPENSIONE DI 2 SETTIMANE

- Febbre > 38°C e affezioni di tipo influenzale dopo la cessazione dei sintomi.

SOSPENSIONE DI 1 SETTIMANA DALLA COMPLETA GUARIGIONE CLINICA

- Interventi chirurgici minori (piccole suture per ferite lacerate o escissione di lipomi, nevi benigni ecc...)
- Estrazione dentaria non complicata, devitalizzazione, implantologia.
- Vaccinazione Epatite B

SOSPENSIONE DI 48 ORE

- Cure dentarie di minore entità (piccole carie, controllo di protesi dentarie, detartraggio)
- Vaccinazioni (con virus-batteri-rickettsie inattivati/uccisi o vaccini ricombinanti, Epatite A)
 - Per le terapie farmacologiche il tempo di sospensione è variabile in base al principio attivo del medicinale assunto e della patologia oggetto di cura (da valutare con il medico del CT).

N.B. In caso di viaggi all'estero chiedere sempre tempi di sospensione al medico del C.T.