

	SGQ EN-Iso 9001:2008 U.O.C. Centro Trasfusionale	CT_PO_DON_01_ALL02
	Allegato <b>VACCINAZIONI</b>	REV 01 del 05/01/16
		Pag. 1 di 1

## VACCINAZIONI

I donatori che si sottopongono a vaccinazioni devono astenersi dalle donazioni per i seguenti periodi:

<b>Tipo di vaccinazione</b>	<b>Periodo di sospensione</b>
Virus o batteri vivi attenuati (BCG, Poliomelite Sabin , Morbillo, Parotite, Rosolia, Tifo per os, Febbre Gialla)	4 settimane
Virus, batteri o rickettsie inattivati/uccisi e vaccini ricombinanti (Colera, Tetano, Febbre montagne rocciose, Meningite, Peste, Pertosse)	48 ore se il soggetto è asintomatico
Tossoidi (Difterite)	48 ore se il soggetto è asintomatico
Vaccino dell'Epatite B	7 giorni se il soggetto è asintomatico e se non vi è stata esposizione
Vaccino dell'Epatite A	48 ore se il soggetto è asintomatico e se non vi è stata esposizione
Rabbia	48 ore se il soggetto è asintomatico e se non vi è stata esposizione 1 anno se il vaccino è stato somministrato dopo l'esposizione
Vaccini dell'encefalite da zecche	Nessuna esclusione se il soggetto sta bene e se non vi è stata esposizione

Estratto da D.M. 2 Novembre 2015 *Supplemento ordinario n.69* della Gazzetta Ufficiale del 28.12.2015.